Le Numéro : 10 CENTIMES — N° 57 — 15 Juillet 1896 — 7 FRANCS par An.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

ABONNEMENTS :
et Départements. . . . . 7 fr.
nger. . . . . 10 fr.
abonnements partent du commencement de chaque mois.

ADMINISTRATION
ORGES CARRÉ, ÉDITEUR
3, RUE RACINE, Paris

DIRECTION SCIENTIFIQUE

F. BRUN
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY
Professeur de thérapeutique, Médecin de l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER
Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers

E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur des hôpitaux.

M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine

L. OLIVIER
Docteur ès sciences.

DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

M LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

Tout ce qui concerne la Rédaction doit être adressé à
M. LE Dr DE LAVARENNE
SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL

Les communications verbales sont reçues les lundi et vendredi
De 4 à 6 heures
3, RUE RACINE, Paris

SOMMAIRE

GNOSTIC DU CANCER DE L'ESTOMAC, par Maurice Letulle (avec une figure en couleur) 333
SUCCÉDANÉS DE L'IODOFORME, par M. F. busquet. 336
ERCULOSE DE LA PAROTIDE, par MM. M. gueu et M. Marien (avec deux figures en cou- ur) 338

MÉDECINE PRATIQUE
tement du tabes, par M. R. Romme. 334

SOCIÉTÉS SAVANTES
iété de biologie : Les courants à haute fréquence les maladies, M. d'Arsonval. — Application des cou- nts à haute fréquence dans une crise aiguë de rhuma- me, M. Soulages. — L'oïdium albicans, agent patho- ne général, MM. Charrin et Ostrowsky. — La aladie pyocyanique chez l'homme, M. Charrin. — echerches expérimentales sur les effets et la valeur ysiologiques des injections massives de la solution ée simple et de la solution saline composée, MM. Bosc et Vedrl. — Injections intra-vasculaires d'eau salée ns l'intoxication diphtéritique expérimentale, MM. nriquez et Hallion. — Rôle du streptocoque dans la thogénie de l'ecthyma, MM. Thibierge et F. Bezan- n. — Action anticoagulante du sang de lapin sur le hien, M. Gley. — A propos de l'influence du foie sur ction anticoagulante de la peptone, M. Gley. — Nou- elles remarques critiques au sujet du rôle du foie et de masse intestinale, sur l'action anticoagulante des in- ctions intravasculaires de peptone chez le chien, . Contejean. — Action anticoagulante des extraits organes, M. Contejean. — Recherches sur le sang et lymphe de peptone, MM. Athanasiu et Carvallo. — ur les propriétés hémostatiques de la gélatine, M. P. arnot. — Le fer dans le foie et dans la rate ; compa- aison de l'homme avec diverses espèces animales, MM. uillemonat et Lapicque. — Influence exercée par la ièvre sur les actions chimiques intraorganiques et la hermogenèse, M. Kaufmann. — Méthode pour étudier ur le cadavre les changements de position que subis- ent les organes voisins, MM. Picou et Ramond. — Note sur un perfectionnement apporté au sphygmo- nètre, M. Bloch. — Sur deux espèces et un genre nou- eaux de sarcoptides psoriques, M. Trouessart . . CCLXXXVI
ciétés étrangères : Italie. CCLXXXVII

BIBLIOGRAPHIE
éparation au sevrage, par M. Plateau. — Nouveaux léments d'ophtalmologie, par MM. H. Truc et E. Va- cude. CCLXXXVII
ibliographie. CCLXXXVII

VICHY-CÉLESTINS

OUGUES St-LÉGER Souverain antidote des maladies de l'estomac.

HAMAMELIDINE LOGEAIS

A RÉVEILLE Véritable eau de régime des faibles et des convalescents.

BIARRITZ THERMES SALINS
Sources chlorurées sodiques fortes, bromo-iodurées, à 24° de salure.
Lymphatisme, Tuberculose ganglionnaire et osseuse.
Rachitisme. Mal. de l'enfance et de la femme.

FACULTÉ DE MÉDECINE

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Lundi 20 Juillet 1896, à 1 heure. — M. Sigaut : Contribution a étude médicale du sénecon. Action emménogogue; MM. Fournier, Remy, Gaucher, André. — M. Virely : Contribution à l'étude du cancer de la verge; MM. Fournier, Rémy, Gaucher, André. — M. Ortiz : Contribution à l'étude des fractures du corps du tibia; MM. Fournier, Rémy, Gaucher, André. — M. Goujon : Contribution à l'étude de l'ictère, dans la période secondaire de la syphilis acquise; MM. Fournier, Rémy, Gaucher, André.

A 9 heures. — M. Petitpas : De l'indicanurie. Etude pathogénique et séméiologique. Valeur clinique; MM. Straus, Ch. Richet, Widal, Chassevant.

A 1 heure. — M. Gamblin : Du traitement ioduré dans les affections des voies respiratoires; MM. Straus, Ch. Richet, Widal, Chassevant. — M. Chaix : Traitement de l'uréthrite blennorrhagique chez la femme par les tiges d'ichthyol; MM. Straus, Ch. Richet, Widal, Chassevant. — M. Vernhes : Du scorbut infantile compliqué ou non du rachitisme. Maladie de Barlow; MM. Straus, Ch. Richet, Widal, Chassevant. — M. Dubé : De la grossesse et de l'accouchement chez les primipares; MM. Pinard, Marchand, Varnier, Delbet. — M. Siou : Contribution à l'étude de l'hydramnios, dite aiguë, et de son traitement; MM. Pinard, Marchand, Varnier, Delbet. — M. Monsiorski : Etude historique sur l'insertion vicieuse du placenta; MM. Pinard, Marchand, Varnier, Delbet. — M. Clavaud : Hydropisie de l'amnios dans les grossesses gémellaires; MM. Pinard, Marchand, Varnier, Delbet. — M. Floersheim : Traitement chirurgical de l'hypertrophie de la prostate; MM. Tillaux, Reynier Tuffier, Lejars. — M. Dassonville : Contribution à l'étude du traitement chirurgical de l'hypertrophie de la prostate; MM. Tillaux, Reynier, Tuffier, Lejars. — M. Sassier : Des bruits subjectifs de l'ouïe; MM. Tillaux, Reynier, Tuffier, Lejars. — M. Touillon : De la castration double dans l'hypertrophie de la prostate. MM. Tillaux, Reynier, Tuffier, Lejars.

Mardi 21 Juillet, à 9 heures. — M. Boudaut : Le tétanos et la sérumthérapie; MM. Tillaux, Reclus, Delbet, Sébileau. — M. Gaudeffroy : Essai sur la coxalgie fistuleuse de l'enfant; MM. Tillaux, Reclus, Delbet, Sébileau. — M. Parizeau : L'arthrite blennorrhagique aiguë et son traitement par l'arthrotomie précoce; MM. Tillaux, Reclus, Delbet, Sebileau. — M. Portout : Contribution à l'étude du chancre syphilitique des paupières; MM. Tillaux, Reclus, Delbet, Sebileau. — M. Dubost : Etudes sur les complications septicémiques et pyohémiques des angines aiguës non diphthériques : MM. Straus, Charrin, Achard, Wurtz. — M. Thomas de la Plesse : Etudes sur quelques cas d'adénopathie trachéo-bronchique hérédo-syphilitique; MM. Straus, Charrin, Achard, Wurtz. — M. Ladevic : Le traumatol. Ses propriétés antiseptiques et thérapeutiques; MM. Straus, Charrin, Achard, Wurtz. — M. Billard : Traitement de la sciatique par la méthode hypodermique : MM. Straus, Charrin, Achard, Wurtz. — M. Favre : La docimasie pulmonaire. Rôle de la putréfaction du poumon. Etude médico-légale; MM. Pouchet, Landouzy, Chantemesse, Thoinot. — M. Chassy : De l'angine variolique. Sa valeur diagnostique et pronostique. Conclusions basées sur 819 observations personnelles; MM. Landouzy, Pouchet, Chantemesse, Thoinot. — M. de Caze : Etude clinique sur la gangrène pulmonaire consécutive à la grippe; MM. Landouzy, Pouchet, Chantemesse, Thoinot. — M. Landel : Contribution à l'étude clinique de la méningite tuberculeuse de l'adulte; MM. Landouzy, Pouchet, Chantemesse, Thoinot.

A 1 heure. — M. Riffé : Le typhus exanthématique à Paris en 1894; MM. Proust, Dieulafoy, Roger. Thoinot. — M. Choppin : De la perforation dans l'ulcère latent de l'estomac; MM. Dieulafoy, Proust, Roger, Thoinot. — M. Labat de Lambert : Contribution à l'étude de la pathologie et du traitement de l'épilepsie; MM. Dieulafoy, Proust, Roger, Thoinot. — M. Sauvé : L'hémoptysie des pneumoniques; MM. Dieulafoy, Proust, Roger, Thoinot. — M. Lecœuvre : De l'héméralopie. — Sur une épidémie d'héméralopie avec xéropsis épithélial. (Etude séméiologique) ; MM. Panas, Le Dentu, Campenon, Quénu. — M. Prévost : Contribution à l'étude de la prothèse osseuse (os décalcifié, plombage, prothèse proprement dite) ; MM. Le Dentu, Panas, Campenon, Quénu. — M. de Castro Medeiros : De la greffe de Thiersch ; MM. Le Dentu, Panas, Campenon, Quénu. — M. Bossan : Contribution à l'étude clinique et expérimentale de l'ammoniurie; MM. Le Dentu, Panas, Campenon, Quénu. — M. Masson : Etude historique, clinique et thérapeutique de la dyspnée tonique; MM. Debove, Hutinel, Marie, Letulle. — M. Sangline : Contribution à l'étude de l'hépatoptose ; MM. Debove, Hutinel, Marie, Letulle. — M. Amelin : Maladie de Landres-Beauvais chez l'enfant. Rhumatisme chronique; MM. Debove, Hutinel, Marie, Letulle. — M. Lévy (Armand) : Du traitement des tuberculoses locales en général et de la coxalgie fistuleuse en particulier; MM. Debove, Hutinel, Marie, Letulle.

Mercredi 22 Juillet 1895, à 9 heures. — M. Melo : Cardiopathies valvulaires et névroses ; MM. Potain, Grancher, Gilbert, Marfan. — M. Samways : Rôle de l'oreillette gauche, notamment dans le rétrécissement mitral; MM. Potain, Grancher, Gilbert, Marfan. — M. Bernard : Bruits du cœur dans la fièvre typhoïde; MM. Potain, Grancher, Gilbert, Marfan. — M. Michalovitch : Traitement de la coqueluche par le bromoforme; MM. Grancher, Potain, Gilbert, Marfan. — M. Espinat : Contribution à l'étude des irido-choroïdites; MM. Panas, Pouchet, Nélaton, André. — M. Ricapet : Contribution à l'étude de la noix d'Arec; MM. Pouchet, Panas, Nélaton, André. — M. Bensa : De l'extirpation totale de la vessie pour cancer ; MM. Pouchet, Panas, Nélaton, André. — M. Dautan : Des différents procédés de massage dans le traitement de l'otite moyenne chronique; MM. Pouchet, Panas, Nélaton, André. — M. Causeret : L'airol en thérapeutique et principalement dans la blennorrhagie; MM. Fournier, Marie, Gariel, Roger. — M. Burais : Application de la photographie à la médecine; MM. Fournier, Marie, Gariel, Roger. — M. Barasch : Influence dystrophique de l'hérédité syphilitique; MM. Fournier, Marie, Gariel, Roger. — M. Le Même : De l'hydarthrose intermittente et de son traitement chirurgical; MM. Berger, Monod, Walther, Poirier. — M. Caroli : Contribution à l'étude du traitement chirurgical de la névralgie faciale; MM. Berger, Monod, Walther, Poirier. — M. Pourtier : Du prolapsus de la muqueuse uréthrale chez la femme ; MM. Berger, Monod, Walther, Poirier. — M. Eisberg : Contribution à l'étude des tuberculoses chirurgical (processus tuberculeux et sa curabilité) ; MM. Berger, Monod, Walther, Poirier. — M. Marotte : Contribution à l'étude des pigmentations pathologiques ; MM. Brouardel, Debove, Letulle, Thoinot. — M. Fournier : Origine microbienne de la lithiase biliaire; MM. Debove, Gaucher, Letulle, Thoinot. — M. Dongradi : Considérations sur la topographie du zona ; MM. Debove, Gaucher, Letulle, Thoinot. — M. Le Dard : La paralysie faciale dans le tétanos céphalique; MM. Debove, Gaucher, Letulle, Thoinot.

A 1 heure. — Darteyre : Le lysol. Ses propriétés antiseptiques, thérapeutiques et désinfectantes ; MM. Sraus, Rémy, Gilles de la Tourette, Chassevant. — M. Bero : Contribution à l'étude des nerfs et de la moelle chez les amputés ; MM. Straus, Rémy, Gilles de la Tourette, Chassevant. — M. Rueda : Association de l'hystérie avec les différentes maladies ; MM. Straus, Rémy, Gilles de la Tourette, Chassevant. — M. Zachariadès : Existence des cellules ganglionnaires dans les racines antérieures sacrées de l'homme ; MM. Straus, Rémy, Gilles de la Tourette, Chassevant. — M. Dorison : Rhinite hypertrophique ; MM. Pinard, Marchand, Varnier, Broca. — M. Gols-

Phospho-Glyco-*Glycérophosphate de fer et Manganèse* FER CHEYNET

OBJETS DE PANSEMENT DESNOIX

Glycérophosphate de chaux Freyssinge.

BORICINE MEISSONNIER Antisepsie des muqueuses.

PIEGLE : Spermathorrhée neurasthénique ; MM. Pinard, Marchand, Varnier, Broca. — M. LEMARIEY : De l'otite moyenne aiguë ; MM. Pinard, Marchand, Varnier, Broca. — M. DE COMBES : Cure radicale de la hernie inguinale par par la méthode sclérogène. Résultats immédiats : MM. Lannelongue, Tillaux, Lejars, Poirier. — M. BERTRAND : De la luxation incomplète, récidivante et volontaire du genou, consécutive à la déchirure de ligaments croisés ; MM. Tillaux, Lannelongue, Lejars, Poirier. — M. BÈS : Etude des kystes synoviaux des doigts ; MM. Tillaux, Lannelongue, Lejars, Poirier. — M. GUILLEMONAT : Recherches anatomo-pathologiques et expérimentales sur la teneur en fer du foie et de la rate ; MM. Gauthier, Ch. Richet, Gley, André. — M. JOTEYKO : La fatigue et la respiration élémentaire du muscle ; MM. Ch. Richet, Gautier, Gley, André. — M. BERETTA : De la sérothérapie dans les néoplasmes ; MM. Ch. Richet, Gautier, Gley, André. — M. CHEVROLLE : Traitement de la tuberculose testiculaire ; MM. Terrier, Pouchet, Tuffier, Ricard. — M. LE LIONNAIS : Quelques considérations sur les difficultés du diagnostic des tumeurs de l'hypocondre droit formées par la vésicule biliaire ; MM. Terrier, Pouchet, Tuffier, Ricard. — M. DOMINÉ : Etude sur les progrès réalisés dans le traitement de la blennorrhagie uréthrale chez l'homme ; MM. Pouchet, Terrier, Tuffier, Ricard. — M. FORTIN : Valeur diagnostique des malformations dentaires observées chez les irido-syphilitiques ; MM. Pouchet, Terrier, Tuffier, Ricard. — M. DUPAIGNE : Opothérapie surrénale chez les addisoniens ; M. Landouzy, Reclus, Netter, Widal. — M. DELANNOISE : Considérations cliniques sur la période prééruptive de la varicelle ; MM. Landouzy, Reclus, Netter, Widal. — M. LECLERC : Des moyens simples à employer pour guérir et éviter la tuberculose ; MM. Landouzy, Reclus, Netter, Widal.

Jeudi 23 Juillet 1896, à 9 heures. — M. FINET : De la valeur curative ou palliative de l'exérèse dans le cancer du rectum ; MM. Terrier, Pouchet, Reynier, Walther. — M. MIGNOT : Recherches expérimentales et anatomiques sur les cholecystites ; MM. Terrier, Pouchet, Reynier, Walther. — M. DERÉGNANCOURT : Lipomes de la langue ; MM. Pouchet, Terrier, Reynier, Walther. — M. ARCHAMBAULT : De la polydactylie au point de vue héréditaire : coïncidence des malformations avec les tares névropathiques ; MM. Pouchet, Terrier, Reynier, Walther. — M. ESPAGNAC : Etude sur la phlébite blennorrhagique ; MM. Fournier, Landouzy, Netter, Gilles de la Tourette. — M. FUCHS : Traitement de la migraine par le bromure de potassium ; MM. Fournier, Landouzy, Netter, Gilles de la Tourette. — M. ALARDO : Contribution à l'étude des formes endémiques du favus ; MM. Fournier, Landouzy, Netter, Gilles de la Tourette. — M. COUILLAUD : Dystrophie papillaire et pigmentaire ou Achantosis nigricans. Ses relations avec la carcinose abdominale ; MM. Fournier, Landouzy, Netter, Gilles de la Tourette. — M. RICHELET : Du bassin généralement rétréci au point de vue obstétrical ; MM. Strauss, Marie, Achard Bonnaire. — M. BIDAU : De l'insuffisance hépatique ; MM. Straus, Marie, Achard, Bonnaire. — M. AYMÉ : Contribution à l'étude de l'hypertrophie de l'amygdale ; MM. Straus, Marie, Achard, Bonnaire. — M. LE FRANÇOIS : Exposé des méthodes thérapeutiques employées dans le traitement de la tuberculose pulmonaire ; MM. Straus, Marie, Achard, Bonnaire.

A 1 heure. — M. PIERROT : Sur la méthode statistique et son emploi dans les sciences médicales ; MM. Proust, Dieulafoy, Ménétrier, Charrin. — M. POIRRIER : Sur une période des épidémies d'oreillons dans les pensionnats de jeunes garçons et ses rapports avec la période d'incubation ; MM. Proust, Dieulafoy, Ménétrier, Charrin. — M. PRAUD : Troubles névropathiques consécutifs à l'ablation de l'utérus et annexes ; MM. Dieulafoy, Proust, Ménétrier, Charrin. — M. SERGE : Séméiologie des déformations digitales ; MM. Dieulafoy, Proust, Charrin. — M. MOUTIN : Le diagnostic de la suggestibilité ; MM. Richet, Debove, Gley, Marfan. — M. HOUDINET : Hémoptysie et dilatations bronchiques ; MM. Debove, Ch. Richet, Gley, Marfan. — M. GUÉRIN (E.) : L'entéroclyse dans les diarrhées infantiles ; MM. Debove, Richet, Gley, Marfan. — M. GUÉRIN (J.) : De la température dans la coqueluche ; MM. Debove, Ch. Richet, Gley, Marfan. — M. LAROCHE : Contribution à l'étude de l'inclusion des kystes dans les ligaments larges ; MM. Le Dentu, Nélaton, Albarran, Hartmann. — M. FREZ : De l'utilité du curettage précoce comme moyen thérapeutique et prophylactique dans les rétentions intra-utérines de débris placentaires ou membraneux ; MM. Le Dentu, Nélaton, Albarran, Hartmann. — M. CLARET : Des tumeurs kystiques intra-pelviennes secondaires à l'hystérectomie vaginale ; MM. Le Dentu, Nélaton, Albarran, Hartmann. — M. FRAPPIER : Vaisseaux sanguins de l'utérus. Des différents procédés d'hémostase dans les hystérectomie ; MM. Le Dentu, Nélaton, Albarran, Hartmann.

Vendredi, 24 Juillet 1896, à 9 heures. — M. POLY : Des accidents laryngés et particulièrement de la sténose glottique dans l'adénopathie trachéo-bronchique ; MM. Potain, Grancher, Ménétrier, Wurtz. — M. MACÉ : Etude sur les érythèmes pneumoniques. Rash pneumonique de Cadet de Gassincourt) chez l'enfant ; MM. Potain, Grancher, Ménétrier, Wurtz. — M. GAGEY : Contribution à l'étude de l'hémoglobinurie (Un cas d'hémoglobinurie continue au cours d'un xeroderma pigmentosum) ; MM. Grancher, Potain, Ménétrier, Wurtz. — M. PAUMOLLE : Recherches sur le pouls dans la pneumonie franche des enfants, principalement pendant la convalescence ; MM. Grancher, Potain, Ménétrier, Wurtz. — M. PATÉ : Essai d'études cliniques sur le traitement de l'infection puerpérale par les injections de sérum antistreptococcique et les injections intra-veineuses d'eau salée ; MM. Ch. Richet, Tuffier, Gley, Bonnaire. — M. ROUSSEAU : Traction rythmée de la langue et insufflation dans l'asphyxie des nouveau-nés ; MM. Ch. Richet, Tuffier, Gley, Bonnaire. — M. PICOU : De la situation normale de la rate par rapport à la paroi thoracique chez l'homme adulte ; MM. Ch. Richet, Tuffier, Gley, Bonnaire. — M. BOULLANGER : De l'action de la glande thyroïde sur la croissance ; MM. Ch. Richet, Tuffier, Gley, Bonnaire. — M. PIGEONNAT : Contribution à la thérapeutique chirurgicale des gros fibromes utérins (Hystérectomie abdominale. Méthode rétropéritonéale) ; MM. Berger, Polaillon, Lejars, Chassevant. — M. VESENAT : De la blennorrhagie ascendante chez la femme ; MM. Berger, Polaillon, Lejars, Chassevant. — M. BASSAGET : De l'hydrocystome (Contribution à la pathologie des glandes sudoripares ; MM. Berger, Polaillon, Lejars, Chassevant. — M. MARMIER : Les toxines et l'électricité ; MM. Berger, Polaillon, Lejars, Chassevant.

A 1 heure. — M. FORESTIER : De la gangrène par artériosclérose et de son traitement ; MM. Terrier, Monod, Ricard, Walther. — M. PIEDVACHE : De la néphrolithotomie comme traitement de la lithiase rénale, en particulier dans les petits calculs du rein ; MM. Terrier, Monod, Ricard, Walther. — M. CHAPARD : Des déformations thoraciques et des déviations rachidiennes ; MM. Terrier, Monod, Ricard, Walther. — M. MONJOIN : Traitement de la pneumonie par la digitale à haute dose ; MM. Tillaux, Reclus, Broca, Thiéry. — M. LACHOUILLE : Etude comparative de l'ostéotomie et de la résection dans les ankyloses du genou consécutives à des tumeurs blanches, chez l'enfant : MM. Tillaux, Reclus, Broca, Thiéry. — M. BRINON : Des hydronéphoses congénitales et des dilatations congénitales de l'uretère ; MM. Tillaux, Reclus, Broca, Thiéry. — M. LEMÈRE : Sur l'hémorrhagie du cordon ombilical ; MM. Pinard, Marchand, Varnier, Gaucher. — M. LARAN : Traitement de l'infection puerpérale par le sérum de Marmorek ; MM. Pinard, Marchand, Varnier, Gaucher. — M. BALLAND : De l'influence du saturnisme sur la marche de la grossesse, le produit de la conception et de l'allaitement : MM. Pinard, Marchand, Varnier, Gaucher. — M. PIAGET : Etude sur les divers moyens de défense de la cavité nasale contre l'invasion microbienne ; MM. Straus, Reynier, Gilles de la Tourette, Thoinot. — Mlle TREYTLINE : Cirrhose syphilitique héréditaire tardive ; MM. Straus, Reynier, Gilles de la Tourette, Thoinot. — M. ECART : Quelques observations de paralysie générale de longue durée ; MM. Straus, Reynier, Gilles de la Tourette, Thoinot. — M. RICARDEAU : Contribution à l'étude des délires alcooliques ; MM. Straus, Reynier, Gilles de la Tourette, Thoinot.

Samedi, 25 Juillet 1896, à 9 heures. — M. PEYRICHON : Etudes sur les hygromas des bourses séreuses de la face antérieure du genou ; MM. Straus, Hutinel, Widal, Poirier. — M. RABINER : Contribution à l'étude clinique du mutisme et du bégaiement chez les hystériques ; MM. Straus, Hutinel, Widal, Poirier. — M. MAUVAIS : Essai sur les pleurésies parapneumoniques ; MM. Straus, Hutinel, Widal, Poirier. — M. DUPONT : Traitement et pathogénie de certaines tumeurs douloureuses du rebord alvéolaire consécutives à l'extraction des dents : MM. Straus, Hutinel, Widal, Poirier.

HOPITAUX

Concours des Hôpitaux (2e Chirurgie). — Ont obtenu :

Séance du 10 Juillet.

MM.		MM.	
Chevalier	18	Villemin	18
Rieffel	20	Thiéry	18

NOUVELLES

Septième congrès des aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française (Nancy 1896). — Le septième congrès des aliénistes et neurologistes se tiendra à Nancy, du 1er au 6 Août 1896, dans un amphithéâtre de l'Institut anatomique, rue Lionnois, 23, où le secrétariat se trouvera également transporté pendant la durée du Congrès.

PROGRAMME : *Samedi, 1er Août* : Matin, 10 heures, séance solennelle d'ouverture, dans une galerie de la salle Poirel, rue Victor Poirel. — Soir, 2 heures. Première question du programme : Pathogénie et physiologie pathologique de l'hallucination de l'ouïe. Rapporteur, M. Séglas. Discussion.

Dimanche, 2 Août : Excursion à Maréville, visite de l'asile. Banquet offert aux congressistes par l'administration de l'asile.

Lundi, 3 Août : Matin, 9 heures, discussion du premier rapport (*suite*). — Soir, 2 heures, deuxième question du programme. De la séméiologie des tremblements. Rapporteur, M. Lamacq. Discussion.

Mardi, 4 Août : Matin, 9 heures, troisième question du programme. De l'internement des aliénés dans les établissements spéciaux. Thérapeutique et législation. Rapporteur, M. Paul Garnier. Discussion. — Soir, 2 heures, suite de la discussion des rapports. Communications diverses. — Soir, 7 heures, banquet par souscription du congrès.

Mercredi, 5 Août : Matin, 9 heures, communications diverses. — Soir, excursion aux environs de Nancy.

Jeudi, 6 Août : Matin, 9 heures, communications diverses. — Soir, 2 heures, communications diverses. — Soir, 9 heures, réception à l'Hôtel de Ville par la Municipalité. Clôture du congrès.

N. B. — Les membres du Congrès de médecine mentale et nerveuse, qui voudraient prolonger leur séjour à Nancy, pourront également, s'ils sont adhérents, participer aux travaux et aux excursions du Congrès de médecine interne qui s'ouvre à Nancy le 6 Août, sous la présidence de M. le professeur Pitres. (Pour le programme spécial, s'adresser à M. Simon, professeur à la Faculté de médecine, 15, rue de la Ravinelle, Nancy.)

VARIÉTÉS

La peste à Hong-Kong. — La peste bubonique gagne du terrain à Hong-Kong, en dépit des efforts pour l'extirper. En Janvier, le nombre de cas était journellement à peine de 2 ; en Février, il s'élevait à 4 ; en Mars, à 5 ; en Avril, à 10. Parmi les 316 cas de ce dernier mois, on comptait deux religieuses appartenant à un couvent italien et un étudiant du collège de médecine pour Chinois, qui succombèrent tous trois. Sur les 715 cas de l'année, il y avait, au 4 Mai, 629 décès.

Ce fut aux mois de Mai et Juin que, deux ans auparavant, l'épidémie atteignit son point culminant, et, détail curieux à noter, le temps durant les derniers mois a été aussi anormal que pendant les premiers mois de 18[illegible] mais dans un sens précisément opposé. En 1894, [illegible] pluies, qui auraient dû arriver en Mars, retardèrent jusqu'au 17 Mai ; cette année-ci a été presque continuellement humide depuis son commencement.

SOCIÉTÉS SAVANTES

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

11 Juillet 1896.

Les courants à haute fréquence et les maladies. — M. d'Arsonval. Je reviens sur ce sujet, parce que, après avoir indiqué des faits relatifs au diabète, puis signaler des traitements heureux appliqués [illegible] rhumatisme aigu, à une série de chancres mous, soigné à la clinique de M. Gailleton, par M. Coignet.

D'autre part, j'ai affaibli l'invertine à 22 au-dessous de zéro. Grâce à des dispositifs tout spéciaux, j'ai supprimé l'élévation thermique ; dans ces conditions, Phisalix a atténué des venins ; pour les toxines, on échoue et on réussit : cela dépend de la nature, de l'âge de ces toxines, d'une foule de conditions. Jamais, en tout cas, je n'ai eu les énormes atténuations de Bonome et Viola sur les produits du streptocoque.

Application des courants à haute fréquence dans une crise aiguë de rhumatisme. — M. Soulages. M. d'Arsonval présente, au nom de M. Soulages, l'observation d'un malade de quarante-six ans, qui a vu disparaître en quelques jours les douleurs d'une crise aiguë de rhumatisme, par l'application des courants de haute fréquence. Les séances étaient quotidiennes et durraient environ 15 minutes.

L'oïdium albicans, agent pathogène général. MM. Charrin et Ostrowsky. L'oïdium albicans intervient par ses sécrétions, puisque nous avons toujours pu, à l'aide de ces sécrétions, faire varier la température, la composition des urines et amener la mort, preuve plus que suffisante.

Ce parasite intervient également par un processus d'intoxication, en ce sens que, lésant les viscères, en particulier le rein, l'intestin souvent d'une façon intense, il y a rétention relative de toxiques.

Il agit en outre mécaniquement, directement.

En 1895, les auteurs ont obtenu l'état réfractaire. Toutefois, pour avoir une immunité valable, pour accroître la résistance, ils ont dû inoculer des doses successives d'un virus vivant, mais faible. Même dans ces conditions, on réussit mal, moins bien que par l'injection intraveineuse.

La maladie pyocyanique chez l'homme. M. Charrin. Tous les jours, de nouveaux mémoires mettent en lumière les méfaits occasionnés par le virus pyocyanique.

Je présente aujourd'hui une nouvelle observation due à M. Bardon. Il s'agit d'une femme de quarante-cinq ans qui, à volonté, peut faire sortir de ses canaux galactophores, un liquide verdâtre. Après une foule de tentatives de passages, de cultures, on a pu obtenir de la pyocyanine. On voit combien sont multiples les circonstances dans lesquelles se révèle ce virus dans l'espèce humaine.

Recherches expérimentales sur les effets et la valeur physiologiques des injections massives de la solution salée simple et de la solution saline composée. — MM. Bosc et Vedel. Les auteurs tirent de leurs expériences les conclusions suivantes :

Les injections intraveineuses massives de la solution salée simple sont dépourvues de toxicité, malgré la quantité et la vitesse de la solution injectée, dans les limites très larges où ils se sont placés (15 à 83 centimètres cubes par minute).

Les effets physiologiques de ces injections massives sont sans rapport avec la température et la vitesse de la solution ; lorsqu'on a déjà introduit une quantité considérable de liquide, il n'y a plus proportionnalité entre les effets et la dose injectée.

Les injections massives de cette solution produisent une diurèse abondante, qui n'apparaît que trente minutes environ après l'injection, sans élévation de la pression sanguine, sans albuminurie, de l'accélération du cœur et une élévation de la température centrale et périphérique ressemblant à un accès de fièvre.

La solution de chlorure de sodium à 7 pour 1,000 doit être préférée à la solution à 5 pour 1,000.

Les injections intraveineuses massives de la solution saline composée (NaCl et sulfate de soude à 7 pour 1,000) sont dépourvues d'effets nuisibles dans les mêmes conditions que la solution salée simple. Il n'y a aucune différence entre les effets de la solution saline composée et de la solution salée simple. L'adjonction de sulfate de soude au chlorure de sodium ne paraît pas utile ; elle serait plutôt nuisible (Mayet) à la conservation globulaire.

injections en série ont reproduit, pour chaque tion, les mêmes effets qu'une injection isolée et se montrées aussi peu nocives.

solution salée simple paraît la solution de choix les injections intraveineuses massives : elle produit inimum d'effets nocifs et donne le maximum des physiologiques.

jections intra-vasculaires d'eau salée dans oxication diphtéritique expérimentale. — **Enriquez et Hallion.** Dans l'intoxication diphté- ue, l'abaissement de la pression artérielle paraît e facteur principal des accidents ultimes.

njection d'eau salée, en relevant cette pression, retarder la mort : elle peut permettre à l'organisme olonger la lutte contre l'intoxication et parfois d'en pher à condition que les fonctions essentielles ne t pas trop profondément compromises, comme le cas dans les hémorrhagies graves.

njection salée dans l'intoxication diphthéritique ne e pas le lavage du sang et ne favorise pas l'élimi- n des produits toxiques; mais, pratiquée au moment pression artérielle est fortement abaissée, elle avoir une action favorable.

le du streptocoque dans la pathogénie de hyma. — **MM. Thibierge et F. Bezançon.** Dans la génie de l'ecthyma, le staphylocope ne paraît pas un rôle aussi important que celui qu'on lui a ué jusqu'ici. Il semble ne jouer qu'un rôle de be d'infection secondaire.

contre, le streptocoque a été rencontré cinq fois cas étudiés et toujours en grande quantité, souvent ltures presque pures, associé ou non à des staphy- ues ou à des saprophytes. Le streptocoque isolé ces divers cas a tous les caractères du strepto- de l'érysipèle. Ce streptocoque n'a pas paru patho- pour le lapin.

tion anticoagulante du sang de lapin sur le de chien. — **M. Gley.** L'injection de sang de dans les veines du chien diminue beaucoup la ulabilité du sang de ce dernier; cette diminution autant plus marquée que la quantité injectée est considérable.

réciproque n'est pas vraie : du sang de chien injecté la veine jugulaire d'un lapin n'a en rien modifié la ulabilité du sang de cet animal.

peut déjà penser que la production des coagulations vasculaires, à la suite des injections de sang, n'est doute qu'un phénomène secondaire.

propos de l'influence du foie sur l'action anti- ulante de la peptone. — **M. Gley.** Il ne me le pas que, d'après ses propres expériences, M. Con- soit autorisé à affirmer que « toutes les cellules rganisme » participent à la production d'une subs- anticoagulante sous l'influence d'une injection de ne, puisque déjà ni les cellules des reins, ni celles ancréas, ni celles de la glande thyroïde, ni les les n'interviennent dans le phénomène.

expériences de M. Delezenne ont prouvé à leur que, tout au moins, l'intestin, la rate, le rein, le on, le cerveau et les muscles sont inactifs. Il ne donc plus à examiner, au même point de vue, que le des glandes salivaires, du thymus, des amyg- , des testicules ou des ovaires, et, sans doute aussi, moelle et des organes des sens.

ant au fond même de la question, il ne pourrait utilement abordé que par la critique du fait que ont Jean a apporté à l'appui de son opinion, à sa- qu'après l'isolement vasculaire du foie, il a vu la ne exercer encore son action anticoagulante, quoique oup moins énergiquement que sur un animal nor- Il faudrait s'assurer si, dans les conditions dans elles l'animal opère, toute circulation est bien sup- e dans le foie, et chercher aussi si la diminution agulabilité du sang, dans ce cas, ne tiendrait pas ment à la réduction considérable de la masse san- . Mais je ne n'ai pas encore pu répéter cette expé- e et la soumettre à une critique expérimentale.

uvelles remarques critiques au sujet du rôle oie et de la masse intestinale sur l'action oagulante des injections intravasculaires eptone chez le chien. — **M. Contejean** présente uvelles remarques critiques au sujet du rôle du et de la masse intestinale sur l'action anticoagu- des injections intravasculaires de peptone chez le . Il termine en déclarant que ce phénomène ne pa- as être l'exagération d'un fait physiologique.

tion anticoagulante des extraits d'organes. **Contejean.** Entre mes mains, des extraits de foie, uqueuse intestinale, de muscles, de cerveau, de tes- s, injectés dans les vaisseaux du chien ont rendu ng incoagulable pour plusieurs heures, ces injec- ne sont très dangereuses que lorsque ces organes te empruntés à un animal d'espèce différente.

cherches sur le sang et la lymphe de pep- — **MM. Athanasiu et Carvallo.** Des expériences prises par MM. Athanasiu et Carvallo, il ressort un ntéressant : la peptone en injection intraveineuse it, à côté des modifications physico-chimiques lées par Heidenhain dans le sang et dans la lymphe, angement profond dans la constitution morpholo- de ces liquides.

Sur les propriétés hémostatiques de la gélatine. — **M. P. Carnot.** L'auteur a employé plusieurs fois la gélatine pour des épitaxis rebelles chez des hémophiles, pour des métrorrhagies consécutives à des fibromes utérins, pour une plaie de la main où l'hémostase était difficile à faire. Le titre de la solution peut varier dans de larges proportions, 5 à 10 pour 100 environ. La solution peut être faite dans l'eau salée physiologique ou dans un liquide antiseptique.

Enfin, on aura soin de l'employer après l'avoir chauffé au bain marie à 35 degrés environ.

Le fer dans le foie et dans la rate; comparaison de l'homme avec diverses espèces animales. **MM. Guillemonat et Lapicque.** La série pathologique examinée par MM. Guillemonat et Lapicque montre que ce n'est pas l'âge qui fait les chiffres élevés pour la teneur de la rate. Ces chiffres se rencontrent à tout âge, mais presque exclusivement dans les maladies chroniques, c'est-à-dire sur des sujets qui ont une longue histoire pathologique.

Influence exercée par la fièvre sur les actions chimiques intra-organiques et la thermogenèse. — **M. Kaufmann.** Les conclusions générales du travail de M. Kaufmann peuvent être résumées comme il suit :

L'état fébrile est accompagné d'une augmentation de l'activité des échanges respiratoires, de l'excrétion azotée urinaire et de la thermogenèse.

Chez l'animal fébricitant, en état d'abstinence, les phénomènes chimiques intra-organiques sont simplement exagérés, mais non modifiés dans leur nature.

La température rectale et la thermogenèse ne subissent pas les mêmes modifications. Pendant l'état fébrile, la thermogenèse augmente plus dans le foie que partout ailleurs.

Méthode pour étudier sur le cadavre les changements de position que subissent les organes voisins. — **MM. Picou et Ramond** déposent une note dans laquelle ils expliquent comment, à l'aide d'aiguilles aimantées, ils ont pu, sur le cadavre, étudier la statistique des organes abdominaux, sans cesse modifiée par l'état des organes voisins.

Note sur un perfectionnement apporté au sphygmomètre. — **M. Bloch** décrit un nouveau perfectionnement à son sphygmomètre; ce perfectionnement consiste dans un ressort destiné à arrêter à volonté la tige du sphygmomètre quand les battements de l'artère ont disparu.

Sur deux espèces et un genre nouveaux de sarcoptides psoriques. — **M. Trouessart** donne la description du *Sarcoptes chiropterulis* et du *Psoralges libertus*.

R. Mercier.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

ITALIE

A l'*Académie des sciences médicales et naturelles de Ferrare*, **Bennati** rapporte 2 cas d'**une dermatose polymorphe vésiculo-bulleuse** qui, d'après lui, doivent être classés l'un dans la catégorie du pemphigus hystérique, l'autre dans celle du pemphigus chlorotique, décrits par Franke et Hardy. Les raisons pour lesquelles il croit devoir faire ce diagnostic sont les suivantes : dans le premier cas, il s'agit d'une malade hystérique, fille d'hystérique, qui, depuis plusieurs mois consécutifs était atteinte, à l'époque de ses règles, d'une éruption de bulles au visage; cette éruption disparaissait huit ou dix jours après, sans laisser de traces. Le deuxième cas concerne, au contraire, une jeune fille chloro-anémique atteinte d'une éruption analogue aux membres, laquelle a disparu après un mois de durée et ne s'est plus renouvelée.

Bennati se demande, à propos de ce dernier cas, s'il ne s'agit pas ici de la forme de pemphigus de Hardy, et si l'on ne peut pas admettre une forme aiguë, qui guérirait après la disparition de la chloro-anémie. Il est d'accord avec Tomasolli sur la pathogénie et l'évolution clinique de ces deux formes du pemphigus, qui doivent être considérées comme des types distincts, le terrain sur lequel elles se développent étant distinct : la chlorose et l'hystérie.

A la *Société des Hôpitaux de Rome*, **Pardo** relate un cas d'**œdème hystérique**, datant d'un an environ. Il s'agit d'une jeune fille de vingt-neuf ans, à antécédents héréditaires nettement névropathiques. L'œdème a débuté subitement et s'est localisé aux extrémités inférieures (pieds et jambes jusqu'aux genoux), et, d'une façon moins prononcée, aux mains. Le tégument cutané est pâle, froid et prend, par place, un aspect fortement cyanotique; l'œdème est dur, élastique, accompagné de douleurs et de parésie des membres inférieurs. Toute affection organique doit être exclue.

Comme symptômes généraux de l'hystérie, on notait un rétrécissement bilatéral du champ visuel; l'analgésie complète généralisée; l'abolition du réflexe pharyngé; de l'ovarialgie gauche, des céphalées, etc. On admit néanmoins, en principe, du moins, l'existence d'une cardiopathie, mais le traitement local et général, dirigé en ce sens, ne donna aucun résultat. On eut alors recours à la suggestion, et l'on suggéra la guérison de la jambe droite; quelques jours après, cette jambe revint à l'état à peu près normal. Pardo se réserve de publier ultérieurement ses recherches complètes sur l'œdème hystérique, dont il observe actuellement encore deux cas.

Archangeli a vu un cas d'œdème bleu, survenu après un érysipèle, chez une malade qui présentait un rétrécissement du champ visuel. On arriva à guérir l'œdème par la suggestion et l'application d'un bandage compressif (auquel des deux moyens employés faut-il alors attribuer la guérison?).

Sciamanna fait remarquer que le caractère principal des œdèmes hystériques est d'être passagers.

Pardo réplique qu'on connaît des cas d'œdème hystérique dont la durée a été de plus de trois ans. Quant à son cas, la nature hystérique ne saurait être, d'après lui, mise en doute.

A l'*Académie de médecine de Turin*, **Sacerdoti** fait une communication sur l'**influence de la température sur la régénération des tissus.** L'auteur a fait des expériences sur les pattes d'un lapin. Après avoir préalablement rasé les poils, il a soumis chacune des deux pattes à l'action de températures différentes pendant trente-quatre jours, dix heures par jour. Il a pu constater que la patte soumise à l'action d'une température élevée se couvrait plus vite que l'autre de poils, et augmentait également plus vite de longueur. Des recherches microscopiques lui ont montré que les muscles, les os et la peau concouraient à la production de ce phénomène.

Bizzorero insiste sur l'importance de ce fait qui montre que tous les tissus organiques présentent, sous l'influence de l'élévation de la température, une énergie plus grande de développement.

BIBLIOGRAPHIE

M. Plateau. — *Préparation au sevrage.* Ouvrage couronné par la Société d'Hygiène de l'Enfance. Nouvelle édition. Asselin et Houzeau, place de l'École de Médecine, Paris.

Ce petit livre est une sorte de manuel de *cuisine pratique* des enfants du premier âge, à l'usage des mères et nourrices, et même des praticiens.

L'auteur a voulu épargner à ses confrères l'embarras et le temps perdu en explications culinaires sur le choix de telle ou telle farine, les confections, la cuisson des bouillies et panades données au nourrisson après les premiers mois de l'allaitement et au moment du sevrage.

Les chapitres du lait, lait de femme ou des divers animaux qui peuvent le fournir; lait cru ou bouilli, stérilisé, maternisé; les doses et administration; le coupage; les biberons, tétines, galactophores, etc.; les bouillies, panades, leur choix, doses, préparation; les préceptes sur le sevrage, l'époque, l'âge de l'enfant, l'état de la dentition, sont autant de petits résumés remplis de conseils pratiques, faciles à comprendre et à exécuter, et dont la lecture sera utilement conseillée.

« Ce livre, dit M. Plateau dans la Préface, est un modeste *vade mecum* de la mère, de la nourrice, et qui pourra peut-être rendre aussi quelques services aux médecins pour l'administration et la confection des bouillies, panades, etc., dont la *formule culinaire* peut parfois être peu présente à la mémoire... Je me suis efforcé de traiter et de résumer, en quelques pages nettes, claires et concises, ces différents points, et d'en déduire les règles et les conseils nécessaires à une nourrice (mère ou étrangère) pour mener à bien la nourriture du petit enfant jusqu'au sevrage. »

H. Truc et E. Valude. — *Nouveaux éléments d'ophtalmologie*, Maloine, édit., Paris. 1896.

Le manuel de MM. Truc et Valude se recommande tout particulièrement par son caractère pratique, par la concision des nombreux renseignements qu'il contient et par quelques innovations qui nous semblent des plus heureuses. Voici la division générale du premier volume paru : Histoire générale de l'ophtalmologie. Anatomie et Physiologie. Examen de l'œil. Réfraction. Ophtalmoscopie. Technique du laboratoire. Pathologie générale. La technique du laboratoire, c'est-à-dire les moyens d'investigation microscopiques et bactériologiques qui sont d'une utilité incontestable pour le diagnostic, ont leur place justifiée à côté de l'examen physique ou fonctionnel de l'appareil visuel et nous félicitons nos confrères d'avoir les premiers rompus avec la tradition et accordé une place importante à ce chapitre. Nous sommes persuadés que ce volume aura le succès qu'il mérite auprès des étudiants et des praticiens.

V. Morax.

Laupts. — Tares et Poisons. *Perversion et perversité sexuelles*, 1 vol. in-8 raisin, de 372 pages. Prix : 6 fr. (Georges Carré, éditeur).

De Massary. — *Le Tabes Dorsalis.* Dégénérescence du protoneurone centripète, 1 vol. in-8 raisin, de 132 pages. Prix : 3 fr. 50. (Georges Carré, éditeur).

ERRATUM

« La clinique de M. Marfan dont il est question dans le compte-rendu de la Société médicale des hôpitaux du 10 Juillet 1896, a été publiée dans le n° 30 de la *Semaine médicale* et non dans la *Presse*, comme une erreur de typographie le fait supposer. »

L'Éditeur-Gérant : Georges Carré.

Paris. — Imprimerie L. Marthenux, 1, rue Cassette.

LE SACCHAROLÉ DE QUINQUINA VIGIER
contient tous les principes actifs de l'écorce et remplace avantageusement les autres préparations de ce médicament. 3f
VIGIER, Pharmacien, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS.

SANTAL SALOLÉ LACROIX
4 à 8 capsules par jour. — AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES
76, RUE DU CHATEAU-D'EAU, PARIS, ET TOUTES LES PHARMACIES.

LACTO-FER du Dr GISCARD
Marque de Fabrique déposée
C'est la préparation ferrugineuse par excellence. Elle ne fatigue pas l'estomac et ne constipe jamais. Employée avec le plus grand succès dans toutes les maladies qui ont pour cause l'appauvrissement du sang.
DOSE : 2 à 8 pilules par jour. — FLACON DE 100 PILULES : 3 FR.
VENTE EN GROS : CHASSEREAU-MENARD, Commissionnaire, 48, Faubg Poissonnière.

CHLORAL BROMURÉ DUBOIS
Sirop prescrit à la dose de 3 à 6 cuillerées, selon l'âge, dans les 24 heures
MALADIES NERVEUSES, INSOMNIES, VERTIGES, ETC.... COQUELUCHE
Paris, 20, Place des Vosges ET TOUTES PHARMACIES.

LYSOL
ANTISEPTIQUE. — *Échantillon* franco à *MM. Médecins qui en font la demande.*
22 et 24, PLACE VENDOME

GLYCÉROPHOSPHATES
Phosphate vita de JACQUEMAIRE
Identique à celui de l'organisme. *Entièrement assimilable,* à base de CHAUX, de SOUDE ou de FER
1° SOLUT. GAZEUSE; 2° GRANULÉ; 3° SOL. INJECTABLE; 4° SIROP;
Indiqué dans : NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ALBUMINURIE, PHTISIE, ANÉMIE, *Maladies des ENFANTS, CONVALESCENCES, etc.*
SEUL EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS
L. JACQUEMAIRE, Pharmacien de 1re Classe, à VILLEFRANCHE (Rhône) et toutes Pharmacies

CRÉOSOTAL HEYDEN

Contenant **92 0/0** de Créosote de Hêtre pure et **8 0/0** d'Acide carbonique

Seul moyen d'administrer la Créosote de Hêtre à hautes doses sans fatiguer l'estomac, 2 à 3 cuillerées à café par jour.

CACHET DE GARANTIE HH

EXIGER LE CACHET DE GARANTIE " HEYDEN "

AVIS. — C'est la première et seule préparation qui ait été expérimentée dans les hôpitaux et qui ait donné des résultats très satisfaisants pour la guérison de la **TUBERCULOSE.**

VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

CASCARINE LEPRINCE

$C^{24}\ H^{10}\ O^{10}$

ACADÉMIE DE MÉDECINE
(Séance du 14 juin 1892.)

AFFECTIONS DU FOIE

Atonie de l'intestin

DOSAGE SPÉCIAL POUR LES ENFANTS DE 3 A 6 AN



ACADÉMIE DES SCIENCES
(Séance du 1er août 1892.)

CONSTIPATION HABITUELLE

CONSTIPATION
DANS LA
GROSSESSE & L'ALLAITEMENT

La **CASCARINE** est un corps défini ainsi qu'en témoigne le travail présenté à l'Institut et publié dans les *Comptes rendus.* Elle représente le véritable principe actif de la **Cascara Sagrada** (Drs DUJARDIN-BEAUMETZ, M. LAFFONT, etc.). Action régulière, facile à régler. Pas de superpurgation comme avec la plupart des drastiques; action remarquable dans la constipation habituelle; cholagogue indiqué dans les affections du foie, l'atonie de l'intestin, sans aucun inconvénient dans la grossesse et l'allaitement, etc., etc.

24, rue Singer, PARIS

N. B. — *Nous tenons à la disposition du corps médical et principalement de MM. les Chefs de service qui voudront bien nous la demander la quantité nécessaire pour l'expérimentation.*

EXIGER LE NOM : CASCARINE LEPRINCE

Paris. — Imprimerie de la Cour d'appel, L. MARETHEUX, directeur, 1, rue Cassette.